

Tabellen indeholder nuværende racegennemsnit og effekt af én indeksenhed for egenskaberne som indgår i delindekser i NTM. Racegennemsnittet er vægtet over 1.-3. laktation med vægtfaktorerne 0,30: 0,25 og 0,45. Effekt er vist for NAV landene samlet og for de enkelte lande – for mange egenskaber vil nationale og nordiske effekter være ens.

Nedenfor er formler som kan bruges til at beregne en tyrs effekt og forventningen til døtrenes præstation, når avlsværditallet for den enkelte egenskab (for eksempel sålesår) er tilgængelig. Hvis tyrene kun er genomisk testede, er underliggende avlsværdital ikke altid til rådighed, og derfor er formlerne til beregning af effekten anderledes (i dette tilfælde anvendes det overordnede avlsværdital, for eksempel klov sundhed, og dens afvigelse / 2 ganges med en regression mellem sub-indekser og enkelt træk EBV).

### Hvordan beregnes effekt for en tyr

Avlsværditallets afvigelse fra gennemsnit/2 \* effekt af en indeksenhed – eksempelvis 0,003 tilfælde/indeksenhed

Eksempel: Tyr med 110 i avlsværdital for sålesår –  $(110-100)/2 * -0,003 = -0,015$  tilfælde i forhold til racens gennemsnit

### Hvordan beregnes effekten på en gennemsnits datter efter en tyr

Tyrens effekt + racegennemsnit – eksempelvis er der 0,06 tilfælde af sålesår for racen

Eksempel: Tyr med 110 i avlsværdi for sålesår:  $-0,015 + 0,06 = 0,045$  tilfælde hos døtrene

Egenskab	NAV landene		Danmark		Finland		Sverige	
	Gennemsnit	Effekt/ +1 indeksenhed	Gennemsnit	Effekt/ +1 indeksenhed	Gennemsnit	Effekt/ +1 indeksenhed	Gennemsnit	Effekt/ +1 indeksenhed
<b>Y-indeks</b>								
Mælk (305-d, kg)	9883	69,9	9968	72,9	9670	68,2	10029	70,5
Fedt (305-d, kg)	434	2,7	418	2,5	439	2,9	443	2,6
Protein (305-d, kg)	355	2,1	358	2,1	344	2,2	369	2,1
Indekser som ikke indgår i NTM								
Fedt % (305-d)	4,4	0,03	4,2	0,02	4,6	0,03	4,4	0,02
Protein % (305-d)	3,6	0,01	3,6	0,01	3,6	0,02	3,7	0,01
<b>Vækst</b>								
Tilvækst								
Tilvækst - kort periode (g/dag)	561	3,0	577	3,1	537	3,8	553	2,8
Tilvækst - lang periode (g/dag)	526	2,3			535	2,4	496	2,2
Slagteform (1-15)	5,0	0,04	4,2	0,04	4,9	0,04	5,3	0,04
<b>Frugtbarhed</b>								
Interval fra kælvning til første inseminering (køer) (dage)	81	-0,4	77	-0,4	82	-0,4	81	-0,4
Interval fra første til sidste inseminering (kvier) (dage)	27	-0,3	22	-0,3	29	-0,4	27	-0,3
Interval fra første til sidste inseminering (køer) (dage)	43	-0,8	36	-0,7	45	-0,8	44	-0,8
Antal insemineringer (kvier)	1,6	-0,01	1,6	-0,01	1,7	-0,01	1,6	-0,01
Antal insemineringer (køer)	1,9	-0,01	1,8	-0,01	2,0	-0,02	1,8	-0,01
<b>Fødsel</b>								
Livskraft (%)								
1. laktation	96,4	0,05	96,5	0,05	95,6	0,06	97,5	0,04
2. og senere laktationer	97,4	0,02	97,5	0,02	96,7	0,03	98,5	0,01
Forløb (%)								
1. laktation	89,5	0,25	93,9	0,16	83,5	0,34	92,6	0,19
2. og senere laktationer	93,9	0,09	95,7	0,07	90,9	0,12	96,2	0,06
<b>Kælvning</b>								
Livskraft (%)								
1. laktation	96,4	0,04	96,5	0,04	95,6	0,05	97,5	0,03
2. og senere laktationer	97,4	0,02	97,5	0,02	96,7	0,02	98,5	0,01
Forløb (%)								
1. laktation	89,5	0,19	93,9	0,13	83,4	0,27	92,6	0,15

2. og senere laktationer	93,9	0,08	95,8	0,06	90,9	0,11	96,2	0,05
Yversundhed (%)	5,4	-0,36	8,8	-0,45	6,0	-0,40	3,3	-0,30
Generel sundhed								
Reproduktionslidelser – tidlig periode (%)	2,9	-0,09	5,1	-0,13	2,8	-0,10	0,6	-0,04
Reproduktionslidelser – sen periode (%)	8,5	-0,13	2,2	-0,07	12,8	-0,17	4,1	-0,10
Ketose (%)	0,5	-0,02	1,0	-0,04	0,5	-0,02	0,1	-0,01
Øvrige metaboliske sygdomme (%)	2,5	-0,06	5,0	-0,09	2,2	-0,06	1,0	-0,04
Klov- og lemmelidelser (%)	2,8	-0,07	9,1	-0,12	0,6	-0,05	1,9	-0,06
Klovsundhed								
Sålesår (p)	0,03	-0,003	0,04	-0,003	0,03	-0,002	0,03	-0,002
Såleblødning (p)	0,12	-0,006	0,24	-0,009	0,08	-0,005	0,11	-0,006
Balleråd (p)	0,11	-0,006	0,22	-0,010	0,10	-0,006	0,09	-0,006
Digital dermatitis (p)	0,12	-0,004	0,19	-0,004	0,03	-0,002	0,15	-0,005
Digital vorte og nydannelse (p)	0,03	-0,002	0,05	-0,003	0,02	-0,002	0,03	-0,002
Dobbelt sål og hul væg (p)	0,05	-0,002	0,09	-0,002	0,06	-0,002	0,02	-0,001
Proptrækker klov (p)	0,05	-0,002	0,11	-0,003	0,03	-0,002	0,03	-0,002
Kropskapacitet								
Krydshøjde (cm)	143,4	0,28	144,4	0,27	143,3	0,30	143,2	0,25
Kropsdybde (1-9)	6,1	0,03	6,2	0,03	6,0	0,03	6,1	0,03
Brystbredde (1-9)	5,4	0,02	5,6	0,02	5,4	0,03	5,4	0,02
Rib form og retning (1-9)	5,1	0,03	4,6	0,03	5,3	0,04	5,3	0,03
Overlinie (1-9)	6,4	0,03	6,6	0,03	6,3	0,04	6,4	0,03
Krydsbredde (1-9)	5,3	0,04	5,4	0,04	5,2	0,04	5,2	0,04
Krydsretning (1-9)	5,1	0,05	5,4	0,05	5,1	0,05	5,0	0,05
Lemmer								
Hasevinkel (1-9)	5,5	0,04	5,5	0,04	5,6	0,05	5,5	0,04
Hase stilling (1-9)	5,7	0,03	5,7	0,03	5,7	0,04	5,9	0,03
Hasekvalitet (1-9)	5,9	0,05	5,8	0,04	5,9	0,05	6,0	0,04
Knoglebygning (1-9)	6,2	0,04	6,0	0,04	6,2	0,05	6,4	0,04
Klovhældning (1-9)	4,8	0,03	4,7	0,02	4,7	0,03	4,9	0,03
Malkeorganer								
Foryvertilhæftning (1-9)	4,8	0,04	4,2	0,04	5,0	0,04	5,1	0,04
Baggyverhøjde (1-9)	5,2	0,03	4,6	0,04	5,1	0,03	5,6	0,03
Baggyverbredde (1-9)	5,2	0,04	5,0	0,04	4,9	0,04	5,6	0,04
Yverbånd (1-9)	5,1	0,03	4,7	0,04	5,2	0,03	5,2	0,03
Yverdybde (1-9)	4,4	0,06	3,8	0,06	4,5	0,06	4,6	0,06
Yverbalance (1-9)	4,6	0,03	4,5	0,03	4,6	0,03	4,8	0,03
Pattelængde (1-9)	5,0	0,07	5,1	0,08	4,9	0,07	5,0	0,07
Pattetykkelse (1-9)	5,3	0,05	5,6	0,06	5,1	0,05	5,4	0,05
Forpatteafstand (1-9)	5,0	0,05	4,7	0,05	5,0	0,05	5,3	0,05
Bagpatteafstand (1-9)	6,2	0,05	5,7	0,05	6,2	0,05	6,4	0,04
Malketid (g fedt+protein/min)	182	3,3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Temperament (1-5 eller 1-9)	n/a	n/a	5,3	0,06	3,2	0,03	5,6	0,04
Holdbarhed (dage i produktion)	911	11,3	845	10,7	970	11,9	873	10,8
Ungdyrooverlevelse								
Tidlig periode (kvier) (%)	97,7	0,11	96,9	0,13	97,7	0,10	98,0	0,10
Sen periode (kvier) (%)	96,1	0,19	96,1	0,20	96,7	0,17	95,5	0,21
Tidlig periode (ungtyre) (%)	96,3	0,11	96,3	0,11	95,0	0,12	97,9	0,09
Sen periode (ungtyre) (%)	96,4	0,28	94,9	0,35	95,9	0,28	97,8	0,23



**faba**